

GRANALIV®

Paracetamol 500 mg Comprimidos



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Industria Argentina-Venta libre. **LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO:** **¿Qué contiene GRANALIV?** Cada comprimido contiene: Principio activo: Paracetamol 500 mg, Excipientes: Celulosa Microcristalina, Povidona, Estearato de Magnesio, Dióxido de Silicio Coloidal, Almidón Glicolato Sódico. **Acción Terapéutica:** Calma el dolor (Analgésico) Reduce la fiebre (Antifebril) **¿Para qué se usa GRANALIV?** GRANALIV está indicado para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y reducir la fiebre. **¿Qué personas no pueden recibir GRANALIV?** No use este medicamento si es alérgico a Paracetamol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les produzcan asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. No debe administrarse en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo, Enfermedad de riñón, corazón o pulmón. Anemia (disminución de los glóbulos rojos o hemoglobina). No use en niños menores de 12 años. **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar GRANALIV?** Paracetamol puede producir daño hepático si se ingiere en sobredosis. Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal. La ingesta de Paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga Paracetamol conjuntamente con este producto. Consulte a su médico. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?** Pueden aparecer efectos no deseados causados

por el medicamento, como erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos, malestar gástrico. Si usted toma al mismo tiempo anticoagulantes, anticonvulsivantes u otros antiinflamatorios, consulte a su médico antes de tomar este producto. Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre persiste por más de 3 días, consulte a su médico. **¿Cómo se usa GRANALIV?** Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima 4 g/día (8 comprimidos de 500 mg). **No exceder dosis máxima. Niños menores de 12 años y adultos mayores de 65 años:** Consulte con su médico, **¿Qué debo hacer ante una sobredosificación, o si tomé más cantidad de la necesaria?** En caso de sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología: Hospital Posadas. Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Unidad de Toxicología 0800-444-8694 (TOXI), Hospital de Agudos "J. A. Fernández". División de Toxicología (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde". Unidad de Toxicología (011) 4300-2115 / 4362-6063 int. 6217 Hospital Muñiz (011) 4304-2180 / 3380/4306-7855 / 4304 -5555 / 4304 -2946 (int. 213) Hospital Interzonal de Agudos-Especializado en Pediatría "Sor María Ludovica" de La Plata. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica 0800-222-9911 **¿Tiene usted alguna pregunta?** Por preguntas, comuníquese telefónicamente al 011 4639-8540 DONATO ZURLO, & CIA S,R,L, también puede escribir al Depto de Farmacovigilancia del laboratorio vía email: fvigilancia@donatozurlo.com Ante cualquier inconveniente con el producto usted puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT, <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> ó llamar a ANMAT responde 0800-333-1234 **Modo de conservación:** Conservar en su envase original, a temperatura no mayor de 25°C y protegido de la humedad. **Presentaciones:** Envases conteniendo 10 comprimidos: 1 blister x 10 comprimidos, Envases conteniendo 20 comprimidos: 2 blisters x 10 comprimidos. Envases conteniendo 200 comprimidos: Dispenser 20 blisters x 10 comprimidos. Envases conteniendo 300 comprimidos: Dispenser 30 blisters x 10 comprimidos. Envases conteniendo 500 comprimidos: Dispenser de 50 blisters x 10 comprimidos. **ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.** CERTIFICADO: N° 44.487, LABORATORIO: DONATO, ZURLO Y CÍA S,R,L, DIRECTOR TÉCNICO: Farm, Nestor E, Alvarez, ELABORADO EN: DONATO, ZURLO Y CÍA S,R,L, Virgilio 844/56. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. **MANTENGA LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.** Fecha de última revisión: 03 - 2024